

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

### Облепиховое масло

**Регистрационный номер:** P N00270/01

**Торговое наименование:** Облепиховое масло

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Облепихи крушиновидной плодов масло

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав на 1 суппозиторий:**

*активный компонент* - облепихи крушиновидной плодов масло – 500 мг (в пересчете на облепиховое масло концентрат – 300 мг с содержанием суммы каротиноидов в пересчете на бетакаротен 400 мг% – 1,2 мг); *вспомогательные вещества:* масло подсолнечное, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, глицерола моностеарат, жир твердый (Витепсол марки H 15, W 35, Суппосир марки NA 15, NAS 50).

**Описание:** суппозитории торпедообразной формы от оранжевого до темно-оранжевого цвета. Допускается наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** Геморроя средство лечения растительного происхождения

**Код АТХ:** C05AX

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Облепиховое масло стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие. Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).

**Показания к применению**

Геморрой, анальные трещины, эрозивно-язвенные поражения прямой кишки (в том числе, эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит), катаральный и атрофический проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, диарея.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Ректально. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход. Взрослым и подросткам старше 14 лет - по 1 суппозиторию 2 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней. При необходимости, по согласованию с врачом, через 4-6 недель курс лечения повторяют.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.

*Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Данные отсутствуют.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами) отсутствуют.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 500 мг.

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

1 год 6 мес. Не применять препарат после истечения срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/организация, принимающая претензии**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)