

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

### ИХТИОЛ

**Регистрационный номер:** P N003315/01

**Торговое наименование:** Ихтиол

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Ихтаммол

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав на 1 суппозиторий:**

*действующее вещество:* Ихтаммол (ихтиол) – 200 мг (в пересчете на аммиак– 5,13 мг);

*вспомогательные вещества:* вода очищенная, эмульгатор Т-2, жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50))

**Описание:**

Суппозитории торпедообразной формы от темно-коричневого до черно-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается появление налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** противовоспалительное средство для местного применения

**Код АТХ:** D10BX01

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое действие. Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения медиаторов воспаления. При ректальном введении препарат Ихтиол оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, вследствие чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, улучшается обмен веществ, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин, яичниках, маточных трубах, матке у женщин.

*Фармакокинетика*

Не описана.

**Показания к применению**

Сальпингоофорит, эндометрит, простатит – в составе комплексной терапии.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 18 лет).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяют с осторожностью. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Ректально, по 1 суппозиторию 1-2 раза в день, после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 200 мг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий-полиэтилен.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)