

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГЛИЦЕРИН

Регистрационный номер: ЛС-000059

Торговое название препарата Глицерин

Международное непатентованное название Глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий

Действующее вещество: глицерол (глицерин) – 1,24 г или 2,11 г;

вспомогательные вещества: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат.

Описание

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительное средство.

Код АТХ: А06АХ01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника.

Фармакокинетика

Практически не всасывается при ректальном применении.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии, в том числе при беременности и в период грудного вскармливания.

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость, геморрой в стадии обострения, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе.

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Способ применения и дозы

Ректально, через 15-20 минут после приема пищи.

Суппозитории 2,11 г: взрослым и детям старше 7 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.

Суппозитории 1,24 г: разрешается применять с первых дней жизни. Детям до 3 лет – по ½ суппозитория, детям с 3 до 7 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.
При необходимости дозу увеличивают до 2 суппозитория в сутки.

Побочное действие

Аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи). При длительном применении - ослабление физиологического процесса дефекации.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые применяются ректально. При необходимости использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 1,24 г и 2,11 г.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий–полиэтилен. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru