

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**  
**НИГЕПАН®**

**Регистрационный номер:** P N001763/01

**Торговое наименование препарата:** Нигепан®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Гепарин натрия + Бензокаин

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав на один суппозиторий:**

*действующие вещества:* гепарин натрия - 1000 МЕ (8,3 мг при активности гепарина натрия 120 МЕ/мг), бензокаин - 50 мг; *вспомогательные вещества:* вода очищенная, жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35 в соотношении 1:1), Суппосир (марки NA 15, NAS 50 в соотношении 1:1)), моноглицериды дистиллированные (Палсгаард 0093).

**Описание**

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается появление налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** геморроя средство лечения.

**Код АТХ:** C05AX03

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, оказывает антитромботическое, противовоспалительное и обезболивающее действие. Гепарин – антикоагулянт прямого действия, при местном применении препятствует образованию тромбов и прекращает рост уже возникших тромбов, обладает противовоспалительным действием. Бензокаин оказывает местное обезболивающее действие.

**Показания к применению**

Тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Повышенная склонность к кровоточивости, тромбоцитопения.

Детский возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Безопасность препарата Нигепан® при беременности и в период грудного вскармливания не установлена.

### **Способ применения и дозы**

Ректально. Суппозиторий вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы. Взрослым: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки. Длительность курса лечения препаратом Нигепан® в среднем составляет 10-14 дней.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

Имеются отдельные сообщения о случаях развития метгемоглобинемии при применении препаратов, содержащих бензокаин.

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Лекарственное взаимодействие препарата Нигепан® не описано.

### **Особые указания**

При обильных кровавистых выделениях из прямой кишки или при сохранении болезненных симптомов свыше 7 дней необходимо дополнительно проконсультироваться с проктологом.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 1000 МЕ + 50 мг. По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. 2 контурные

ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

**Срок годности**

2 года.

Не применять препарат после истечения срока годности.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Производитель / Организация, принимающая претензии**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)