

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ПСИЛО-БАЛЬЗАМ®**

**Регистрационный номер:** П N015442/01

**Торговое название препарата:** Псило-Бальзам®

**МНН или группировочное название:** Дифенгидрамин

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения

**Состав:**

1 г геля содержит:

*действующее вещество:* дифенгидрамина гидрохлорид – 10 мг; *вспомогательные вещества:* цетилпиридиния хлорид, макрогола глицерилкаприлокапрат, карбомер, триметамол, вода очищенная.

**Описание:**

Бесцветный прозрачный однородный гель.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Противоаллергическое средство - H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов блокатор

**Код АТХ:** D04AA32.

**Фармакологическое действие**

*Фармакодинамика*

Противоаллергическое действие Псило-Бальзама® связано с наличием в его составе дифенгидрамина гидрохлорида, который является блокатором H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов и вследствие этого быстро снижает зуд, уменьшает боль, гиперемию, снижает повышенную проницаемость капилляров, отек тканей; вызывает местную анестезию, за счет чего Псило-Бальзам® обладает приятным охлаждающим действием. Специальная гелевая основа защищает кожу и не оставляет видимого следа.

*Фармакокинетика*

При местном применении абсорбция незначительная, нарушение целостности кожных покровов повышает всасывание препарата.

**Показания к применению**

Солнечные ожоги и ожоги I степени; укусы насекомых; крапивница; кожный зуд различного происхождения (за исключением зуда при холестазе); зудящие дерматозы, экзема, ветряная оспа, аллергические раздражения кожи, контактные дерматиты, вызванные соприкосновением с растениями.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата; одновременное применение любых препаратов, содержащих дифенгидрамин; применение на обширных поверхностях кожи; детский возраст до 2-х лет.

**С осторожностью**

Повреждение кожных покровов в месте нанесения, нанесение на слизистые оболочки.

**Применение при беременности и в период лактации**

Применение препарата при беременности и лактации требует оценки потенциальной пользы для матери и возможного риска для плода и ребенка.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Взрослым и детям старше 2 лет Псило-Бальзам® наносят на пораженные участки кожи (полоску геля длиной 3-5 см. на площадь поражения размером с ладонь) 3-4 раза в день и распределяют его легкими массирующими движениями.

#### **Побочное действие**

Редко - реакции гиперчувствительности кожи (экзема, контактный дерматит).

При наружном применении препарата побочных эффектов системного характера не отмечено.

#### **Передозировка**

Симптомы: покраснение, умеренная отечность участка кожи, на который наносился препарат.

Лечение: промыть водой участок кожи, на который наносился препарат.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами при применении наружных форм дифенгидрамина не описаны.

#### **Особые указания**

Сразу после нанесения Псило-Бальзама® (в течение 1-2 часов) следует избегать длительного пребывания на солнце, чтобы избежать риска развития фотодерматозов.

Во время лечения Псило-Бальзамом® следует избегать употребления алкоголя.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не известно о влиянии на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

#### **Форма выпуска**

Гель для наружного применения 1%. По 20 г или 50 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель / Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение /организация, принимающая претензии**

**АО «Нижфарм», Россия**

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)