

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ГИОКСИЗОН

Регистрационный номер P N002221/01

Торговое название препарата

Гиоксизон

МНН или группировочное название

Гидрокортизон + Окситетрацилин

Лекарственная форма

мазь для местного и наружного применения

Описание

Мазь желтого цвета.

Состав

1 г мази содержит:

действующие вещества: гидрокортизона ацетат – 10,0 мг, окситетрацилина гидрохлорид – 30,0 мг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат – 0,2 мг, вазелин – до 1 г.

Фармакотерапевтическая группа

Глюкокортикостероид для местного применения + антибиотик-тетрацилин

Код АТХ: D07CA01.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, угнетает развитие воспалительных реакций кожи, особенно аллергического происхождения, осложненных бактериальной инфекцией, в результате суммарного действия компонентов, входящих в состав препарата. Окситетрацилин – антибиотик из группы тетрациклинов, оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Rickettsia* spp., *Treponema* spp., *Chlamydia* spp., *Mycoplasma* spp. Гидрокортизон – глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэкссудативный и противозудный эффекты. Тормозит фагоцитоз; уменьшает синтез простагландинов и лейкотриенов путем угнетения активности фосфолипазы A2 и уменьшения высвобождения арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек. Угнетает освобождение интерлейкинов и др. цитокинов, вызывающих воспалительный процесс; тормозит освобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Показания к применению

Дерматит новорожденных (пузырный и эксфолиативный), инфицированная опрелость, фолликулиты, фурункулез, карбункул, импетиго, рожистое воспаление; инфицированные экземы и раны, эрозии; крапивница новорожденного; простой и аллергический дерматит, себорея; «солнечные» эритематозные высыпания; мультиформная экссудативная эритема; укусы насекомых; аллергические и гнойные заболевания наружного слухового прохода; варикозные язвы голени, ожоги, отморожения.

Противопоказания

Гиперчувствительность, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые состояния, микоз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа); беременность, период лактации (при применении на обширных очагах поражения).

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

Мазь в количестве 0,5-1 г наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день или под стерильную марлевую повязку.

Длительность лечения индивидуальна.

Побочное действие

Редко возможны – аллергические реакции, раздражение кожи, зуд, сыпь. При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности – системные побочные эффекты глюкокортикостероидов. При применении на коже лица – возможны телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Гиоксизон мазь не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Во время лечения глюкокортикостероидами (ГКС) не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации (в связи с иммунодепрессивным эффектом ГКС).

У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности и под окклюзионные повязки.

При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким из-за повышенного всасывания и возможности появления побочного действия.

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения.

По 10 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>