

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**  
**БИСАКОДИЛ-НИЖФАРМ**

**Регистрационный номер:** P N001895/01

**Торговое название препарата** Бисакодил-Нижфарм

**Международное непатентованное название** Бисакодил

**Лекарственная форма** суппозитории ректальные

**Состав:**

Один суппозиторий содержит: *действующее вещество:* бисакодил – 10 мг, *основа для суппозиторияев:* жир твердый (Витепсол, марки H15, W35, Суппосир, марки NA 15, NAS 50) – до получения суппозитория массой 1,25 г.

**Описание** Суппозитории от белого до белого со слегка желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

**Фармакотерапевтическая группа** слабительное средство

**Код АТХ:** A06AB02

**Фармакологические свойства**

Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Действие наступает в течение первого часа.

**Показания к применению**

Гипотонические и атонические запоры (в т.ч. запоры у пожилых; запоры после операций и родов). Регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода). Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, спастические запоры, острый проктит, острый геморрой, детский возраст до 8 лет.

**С осторожностью**

Печеночная и/или почечная недостаточность.

## **Применение при беременности и лактации**

С осторожностью возможно применения в период беременности и лактации.

## **Способ применения и дозы**

Ректально, назначают в следующих дозах: взрослым и детям старше 14 лет – 10-20 мг бисакодила (1-2 свечи), детям 8-14 лет – 10 мг бисакодила (1 свеча).

## **Побочное действие**

Кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение артериального давления), боль в животе, метеоризм, аллергические реакции.

## **Передозировка**

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

## **Особые указания**

Не применять в течение длительного времени.

## **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 10 мг, по 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

## **Производитель**

### **ОАО «Нижфарм», Россия**

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, г. Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278 80 88

Факс: (831) 430 72 28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>