

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КАМИСТАД®

Регистрационный номер: П N014852/01

Торговое наименование: Камистад®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Лидокаин + Ромашки аптечной цветков экстракт

Лекарственная форма: гель для местного применения

Состав на 1 г:

действующие вещества: лидокаина гидрохлорида моногидрат – 20,0 мг, ромашки аптечной цветков экстракт (1:4-5) (экстрагент – этанол 50 % (об) с триметамолом 1,37 %) – 185,0 мг;

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50 % раствор, коричника камфорного масло, натрия сахаринат, карбомер, триметамол, муравьиная кислота 98 %, этанол 96 %, вода очищенная.

Описание:

Гель желто-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептическое средство + местноанестезирующее средство

Код АТХ: A01AD11.

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, которое способствует быстрому и продолжительному уменьшению боли при воспалении и повреждении слизистой оболочки полости рта и десен. Экстракт цветков ромашки обладает противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами.

Показания к применению

Болевой синдром при воспалении слизистой оболочки полости рта и губ (при стоматите, хейлите, глетчерной эритеме губ), гингивите (воспалении десен), раздражении слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов и брекетов, прорезывании зубов «мудрости», стоматологических процедурах, после ортопедических операций в челюстно-лицевой хирургии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы

Местно. Полоску препарата длиной 0,5 см наносят на болезненные или воспаленные участки слизистой оболочки полости рта и губ 3 раза в день, втирая легкими массирующими движениями.

На период привыкания к зубным протезам в места сдавливания втирать полоску геля длиной 0,5 см.

Курс лечения зависит от тяжести заболевания.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если во время применения Камистада® появились признаки аллергии, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания

Не допускается попадание препарата в глаза. До и после применения геля рекомендуется вымыть руки.

Камистад® содержит сахарозаменитель натрия сахаринат.

Форма выпуска

Гель для местного применения 20 мг/г + 185 мг/г.

По 10 г в тубы алюминиевые с навинчивающейся крышкой из полиэтилена. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия тубы использовать гель в течение 12 месяцев.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ШТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия

Штадаштрассе 2-18, 61118 Бад-Фильбель

Тел.: (+49) 6101-60 30

Факс: (+49) 6101-60 32 59

Интернет: <http://www.stada.de>

Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru