

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного препарата**  
**Стрептоцид растворимый**

Регистрационный номер: P N000599/01

Торговое название препарата: Стрептоцид растворимый

Международное непатентованное название: Сульфаниламид

Лекарственная форма: линимент

**Описание:**

Белого или белого с кремоватым оттенком цвета линимент, со специфическим запахом.

**Состав**

1 г линимента содержит:

*активное вещество* – сульфаниламид натрия (стрептоцид растворимый) – 0,05 г (в пересчете на 100 % вещество);

*вспомогательные вещества*: глицерол (глицерин дистиллированный) – 0,30 г, эмульгатор №1 (Lanette® SX) – 0,080 г, вода (вода очищенная) – до 1 г.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Противомикробное средство – сульфаниламид

Код АТХ: D06BA05.

**Фармакологические свойства**

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия препарата обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК), угнетением дигидроптероатсинтазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, в том числе *S.pyogenes*, *S.pneumoniae*, *Legionella spp.*, *Brucella spp.*, *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia spp.*, *Calymmatobacterium granulomatis*, *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Nocardia asteroides*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia spp.*, *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

При нанесении на кожу способствует быстрому заживлению ран и эпителизации эрозий.

**Показания к применению**

Инфицированные раны различной этиологии, ожоги (I–II ст.), фолликулиты, фурункулы, карбункулы, вульгарные угри, импетиго, рожа и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, анемия, почечная/печеночная недостаточность, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, азотемия, порфирия, беременность, период лактации.

**С осторожностью**

Детский возраст до 3-х месяцев.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Линимент наносят на марлевую повязку, которую накладывают на пораженную область; перевязки производят через 1–2 дня.

При большой площади поражения суточная доза линимента в пересчете на сульфаниламид не должна превышать 6 г у взрослых (соответствует 120 г линимента), 0,6 г у детей до 1 года (соответствует 12 г линимента), 1,8 г у детей 1–5 лет (соответствует 36 г линимента),

3 г у детей 5–12 лет (соответствует 60 г линимента).

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении больших доз – системное действие: головная боль, тошнота, рвота, диспепсия, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия.

**Передозировка**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Миелотоксичные лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

**Особые указания**

При лечении обширных поражений кожи рекомендуется обильное щелочное питье.

**Влияние на способность управлять автомобилем и другими сложными механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятию потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Линимент 5%.

По 30 г в тубы алюминиевые или тубы полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

4 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии**

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>