

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**  
**ЛЕВОМЕКОЛЬ®**

**Торговое название препарата**

Левомеколь®

**Международное непатентованное название**

Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) + хлорамфеникол.

**Лекарственная форма**

Мазь для наружного применения

**Состав**

Состав на 1 г препарата:

*действующие вещества* - диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 40 мг,  
хлорамфеникол – 7,5 мг;

*вспомогательные вещества* – макрогол-1500 – 190,5 мг, макрогол-400 – 762 мг.

**Описание**

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробное средство комбинированное

Код АТХ: D06C.

**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Легко проникает в глубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации. В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

### **Показания к применению**

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола проходит более медленно, чем у взрослых).

### **Применение при беременности и в период лактации**

Применение при беременности возможно только в случае, если польза для матери превышает риск для плода.

В период лактации следует либо прекратить применение препарата, либо кормление грудью.

### **Способ применения и дозы**

Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°C. перевязки производят ежедневно, один раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г.

Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции (кожные высыпания).

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата Левомеколь® мазь не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.**

Не оказывает.

**Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 40мг/г.+7,5 мг/г.

По 30 г, 40 г или 50 г в тубы алюминиевые или в тубы полиэтиленовые ламинатные.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

3 года 6 месяцев. Не использовать препарат после истечения срока годности.

**Условия хранения**

При температуре не выше 20°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии**

**АО «Нижфарм», Россия**

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru